

emoflon®

Pomada rectal – Instrucciones de Uso



Lea atentamente las Instrucciones de Uso, ya que contienen información importante para el usuario. Este producto es un producto sanitario destinado a ser utilizado en adultos, y debe utilizarse de acuerdo con las indicaciones dadas para una máxima eficacia.

Conserve las Instrucciones de Uso, ya que puede tener que volver a leerlas.

Composición

Sucralfato, manteca de cacao, lanolina (origen vegetal), vaselina blanca, cera blanca de abeja, agua purificada, caprilglicol, extracto de caléndula, extracto de camomila, extracto de hoja de hamamelis.

Descripción del producto

Pomada rectal. Cada tubo contiene 25 g de pomada rectal.
Contenido de la caja: un tubo y un aplicador de plástico que se enrosca al tubo.

¿Qué es emoflon® pomada rectal y para qué se utiliza?

emoflon® pomada rectal está dirigido al tratamiento de los síntomas asociados a la enfermedad hemorroidal y sus complicaciones (por ejemplo: eczema, fisura anal). Cubre y protege la epidermis, y proporciona cuidado de la piel con picor e inflamación, ayudando a favorecer la regeneración de la piel. Disminuye la sequedad de la piel, lo que ayuda a la cicatrización de las heridas, y reduce el riesgo de fisura y el daño causado al defecar.

¿Cuándo debe evitar utilizar emoflon® pomada rectal?

No utilizar si es alérgico a la lanolina o a cualquiera de los demás componentes de este producto.
No utilizar en hemorroides sangrantes.

Embarazo y lactancia

El uso de **emoflon®** pomada rectal no está contraindicado durante el embarazo y la lactancia, pero se recomienda consultar a su médico en estos casos.

Interacciones con otra medicación

No se conocen interacciones de **emoflon®** pomada rectal con otra medicación, por tanto se recomienda consultar a su médico o farmacéutico antes de utilizar esta pomada rectal simultáneamente con otra medicación para uso rectal.

El uso simultáneo de pomada rectal con un preservativo puede reducir la seguridad anticonceptiva.

¿Cómo utilizar emoflon® pomada rectal?

Utilice siempre el producto tal y como está descrito en las Instrucciones de Uso.

Si utiliza el producto de forma diferente a la recomendada en las Instrucciones de Uso, los síntomas podrían no ser aliviados suficientemente, o podría producirle irritación.

Lave sus manos antes de utilizar **emoflon®** pomada rectal.

La pomada debe depositarse alrededor del ano, preferiblemente después de la defecación o de un baño de asiento, o introducirse, con ayuda del aplicador, una pequeña cantidad de la pomada (del tamaño de un guisante) en el recto. Asegúrese de que el tubo y el aplicador están apropiadamente conectados.



Antes de utilizar este producto asegúrese de que el envase está intacto y que el tubo y el aplicador no están dañados.

No utilice este producto si el embalaje o el aplicador está dañado.

Lave el aplicador con agua templada y jabón y cierre el tubo con el tapón protector tras el uso.

Después de utilizar la pomada lávese siempre las manos. Se recomienda utilizar la pomada una o dos veces al día. El aplicador sólo puede ser utilizado por una persona.

emoflon® no debe aplicarse en los ojos o alrededor de los ojos, ni en la boca o en la mucosa de la boca.

Si el producto entra en contacto con las áreas mencionadas previamente, limpie o lave la zona.

La pomada puede manchar la ropa interior, por tanto se recomienda el uso de protege slips.

La duración de uso depende de cómo mejoren los síntomas, pero puede utilizarse hasta 4 semanas sin interrupción.

Consulte a su médico si sus síntomas no mejoran en el transcurso de 1-2 semanas.

Posibles efectos adversos

El uso de cualquier tratamiento local, especialmente en tratamientos de larga duración, puede producir reacciones de hipersensibilidad, los síntomas son sensación de quemazón, picor, dolor o eritema. Si experimenta estos síntomas durante el uso del producto, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Si sufre cualquier otro efecto secundario no incluido en las Instrucciones de Uso, consulte a su médico o farmacéutico.

Advertencias

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. No ingerir el producto.

emoflon® pomada rectal no debe utilizarse por vía vaginal.

Caducidad y condiciones de conservación

La fecha de caducidad es la fecha que se indica en la caja de cartón y en el tubo. La fecha de caducidad y el número de lote se indican en la soldadura del tubo.

No utilice la pomada después de la fecha de caducidad. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

 No almacene **emoflon**® pomada rectal por encima de 25°C.

 Mantener alejado de la luz solar.

Los productos sanitarios no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo debe deshacerse de los productos sanitarios. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Estas Instrucciones de Uso fueron revisadas por última vez en: Marzo 2017

Fabricante:

Egis Pharmaceuticals PLC, Kerresztúri út 30-38.,
Budapest, 1106, Hungría

Distribuidor:

 Laboratorios Servier, S.L.
Avda. de los Madroños 33
20043 Madrid

Explicación de los símbolos del embalaje

	¡Precaución! Lea las Instrucciones antes de usar este producto
	Consulte las Instrucciones de Uso
	No utilice el producto si el embalaje está dañado
	Límite de temperatura
	Mantener alejado de la luz solar
	Fabricante
	Número de lote
	Fecha de caducidad

 **2409**
Producto sanitario